

XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020.

# Correlatos psicosociales del COVID-19 en una muestra de adultos argentinos.

Wyss, Paulina Gertrudis, Brehm, Mónica Patricia, Katz, Olivia y Fernández Mastrantuoni, María De La Paz.

Cita:

Wyss, Paulina Gertrudis, Brehm, Mónica Patricia, Katz, Olivia y Fernández Mastrantuoni, María De La Paz (2020). *Correlatos psicosociales del COVID-19 en una muestra de adultos argentinos. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/726>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/etdS/ere>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# CORRELATOS PSICOSOCIALES DEL COVID-19 EN UNA MUESTRA DE ADULTOS ARGENTINOS

Wyss, Paulina Gertrudis; Brehm, Mónica Patricia; Katz, Olivia; Fernández Mastrantuoni, María De La Paz  
Universidad Argentina de la Empresa. Buenos Aires, Argentina.

## RESUMEN

El COVID-19 ha transformado la vida humana. Los efectos psicosociales del aislamiento social obligatorio están bien documentados a nivel mundial (Brooks et al., 2020; Jeong et al., 2016). El objetivo del presente trabajo era determinar si las personas de riesgo (adultos mayores), aquellos con hijos pequeños, quienes indicaban tener problemas económicos y el tiempo de aislamiento introducían diferencias psicosociales. Se encuestó online a 422 personas adultas (67% mujeres, edades de 18 a 68 años) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Paraná. Completaron preguntas sociodemográficas, el test de Ansiedad ante la Muerte de Templer y el DASS-21 de Lovibond y Lovibond. Las personas de riesgo y aquellas con hijos pequeños presentaban mayores niveles de ansiedad ante la muerte  $p < 0,03$ . A estos últimos -quizás- se les sumaba el estrés de tener que cuidar a sus hijos durante esta situación. Por otra parte, también aquellas personas que sostenían que sus ingresos económicos se habían visto afectados presentaban mayores niveles de ansiedad, estrés y ansiedad ante la muerte  $p < 0,005$ . El tiempo transcurrido en aislamiento se asociaba con mayor ansiedad  $r = 0,12$   $p < 0,05$ . Así, el presente trabajo pone de manifiesto que determinados grupos tienen más riesgos de sufrir los efectos psicosociales del aislamiento.

## Palabras clave

COVID-19 - Correlatos psicosociales - Aislamiento social - Adultos

## ABSTRACT

### PSYCHOSOCIAL CORRELATES OF COVID-19 IN A SAMPLE OF ARGENTINEAN ADULTS

COVID-19 has transformed human lives. However, the psychosocial effects of compulsory social isolation are well documented globally (Brooks et al., 2020; Jeong et al., 2016). The objective of the present work was to determine if people at risk (older adults), those with small children, those who indicated having economic problems and the time of isolation introduced psychosocial differences. 422 adults (67% women, ages 18 to 68 years) were surveyed online in the Autonomous City of Buenos Aires and Paraná. They completed sociodemographic questions, Templer's Death Anxiety test and Lovibond and Lovibond's DASS-21. People at risk and those with children had higher levels of anxiety about death  $p < 0.03$ . The latter - per-

haps - added the stress of having to take care of their children during this situation. On the other hand, also those people who maintained that their economic income had been affected had higher levels of anxiety, stress and anxiety before death  $p < 0.005$ . The time spent in isolation was associated with greater anxiety  $r = 0.12$   $p < 0.05$ . Thus, the present work shows that certain groups are more at risk of suffering the psychosocial effects of isolation.

## Keywords

COVID-19 - Psychosocial correlates - Social isolation - Adults

## BIBLIOGRAFÍA

- Brooks, S. et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *Lancet*, 395, 912-920.
- Jeong, H., Yim, H.W., Song, Y.J., et al. (2016). Mental health status of people isolated due to Middle East respiratory syndrome. *Epidemiological Health*, 38, 16-48.
- Lovibond, S. & Lovibond, P. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales*. Sydney: The Psychology Foundation of Australia.
- Templer D. I. (1970). The construction and validation of a Death Anxiety Scale. *Journal of General Psychology*, 82, 165-177.