

XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2023.

Síntomas psicológicos en adultos con diagnóstico tardío de TEA.

D'Anna, Ana y Gago, Paula.

Cita:

D'Anna, Ana y Gago, Paula (2023). *Síntomas psicológicos en adultos con diagnóstico tardío de TEA*. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/124>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/RhB>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS EN ADULTOS CON DIAGNÓSTICO TARDÍO DE TEA

D'Anna, Ana; Gago, Paula

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

En la década del '40, Kanner (EEUU) y Asperger (Austria), describieron a un grupo de niños que presentaban síntomas tales como el escaso contacto ocular o la ausencia de lenguaje, que actualmente se considerarían dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo; una descripción detallada de dichos síntomas, había sido realizada anteriormente (1925) por Sukhareva, una psiquiatra, ucraniana. El DSM5 (A.P.A., 2013; 2022), define este grupo como un conjunto de alteraciones persistentes en la comunicación e interacción social, junto con la presencia de patrones repetitivos y restrictivos de comportamientos, intereses o actividades. Se presenta el estudio realizado con el inventario de screening SCL-90-R (Adaptación U.B.A. CONICET, Casullo y Pérez, 2008). Posee 90 ítemes que se responden con una lickert de cinco puntos (0-4), agrupados en nueve dimensiones: Somatizaciones, Obsesiones y Compulsiones, Sensitividad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación paranoide, Psicoticismo; y tres índices globales de malestar psicológico. La muestra conformada por 160 sujetos con diagnóstico tardío de TEA, mayores de 18 años, con una media de 33; 50% de mujeres y 50% de varones. El estudio es descriptivo y la muestra es intencional. Se mostrarán los promedios de los puntajes obtenidos en las 9 dimensiones y los 3 índices.

Palabras clave

TEA síntomas autismo - Diagnóstico tardío

ABSTRACT

PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS IN ADULTS WITH LATE DIAGNOSIS OF ASD

In the 1940s, Kanner (USA) and Asperger (Austria) described a group of children who presented symptoms such as poor eye contact or the absence of language, which would currently be considered within Autism Spectrum Disorders; a detailed description of these symptoms had been made earlier (1925) by Sukhareva, a Ukrainian psychiatrist. The DSM5 (APA, 2013; 2022) defines this group as a set of persistent alterations in communication and social interaction, along with the presence of repetitive and restrictive patterns of behaviors, interests, or activities. The study carried out with the screening inventory SCL-90-R (Adaptation U.B.A. CONICET, Casullo and Pérez, 2008) is presented. It has 90 items that are answered with a five-point lickert (0-4), grouped into nine dimensions: Somati-

zations, Obsessions and Compulsions, Interpersonal Sensitivity, Depression, Anxiety, Hostility, Phobic Anxiety, Paranoid Ideation, Psychoticism; and three global indices of psychological distress. The sample made up of 160 subjects with a late diagnosis of ASD, older than 18 years, with an average of 33; 50% women and 50% men. The study is descriptive and the sample is intentional. The averages of the scores obtained in the 9 dimensions and the 3 indices will be shown.

Keywords

ASD symptoms autism - Late diagnosis

BIBLIOGRAFÍA

- A.P.A. (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- A.P.A. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision Dsm-5-tr 5th Edición.
- Casullo, M. M. y Pérez, M. (2008). El Listado de Síntomas SCL-90-R de Derogatis. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones. Facultad de Psicología. UBA.