

Explorando la relación entre la sintomatología depresiva somático-afectiva y cognitiva con la calidad de vida en pacientes con epilepsia en Argentina.

Gerbaudo, María Agostina, Lanzillotti, Alejandra Inés y Sarudiansky, Mercedes.

Cita:

Gerbaudo, María Agostina, Lanzillotti, Alejandra Inés y Sarudiansky, Mercedes (2023). *Explorando la relación entre la sintomatología depresiva somático-afectiva y cognitiva con la calidad de vida en pacientes con epilepsia en Argentina. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/597>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/H6e>

EXPLORANDO LA RELACIÓN ENTRE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA SOMÁTICO-AFECTIVA Y COGNITIVA CON LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON EPILEPSIA EN ARGENTINA

Gerbaudo, María Agostina; Lanzillotti, Alejandra Inés; Sarudiansky, Mercedes
CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología - Consejo Interuniversitario Nacional. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

La epilepsia es una enfermedad caracterizada por presentar convulsiones, con implicaciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La comorbilidad psiquiátrica y afectación de la calidad de vida es mayor que en la población general. La asociación entre calidad de vida y síntomas depresivos ha sido estudiada, aunque se desconocen aún particularidades sobre la relación entre estas variables. El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre los niveles de sintomatología depresiva Cognitiva y Somato-afectiva y la calidad de vida en personas con epilepsia. Se evaluaron 72 pacientes adultos de la Unidad de VideoEEG del Hospital Ramos Mejía (2020-2022). Se administraron escalas para evaluar sintomatología depresiva (BDI-II) y calidad de vida (QOLIE 31-P) y un cuestionario sociodemográfico. Se encontraron asociaciones negativas significativas entre la QOLIE-31P y las dimensiones del BDI-II. La dimensión somática del BDI predijo el puntaje de QOLIE-31P. Estos resultados destacan el impacto de la depresión somática sobre la calidad de vida, ampliando los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes con epilepsia, y entender mejor de qué manera su calidad de vida se encuentra afectada.

Palabras clave

Epilepsia - Depresión - Calidad de vida - QOLIE 31-P

ABSTRACT

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOMATIC-AFFECTIVE AND COGNITIVE DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH EPILEPSY IN ARGENTINA

Epilepsy is a disease characterized by the presence of seizures, with neurobiological, cognitive, psychological, and social implications. Psychiatric comorbidity and impairment of quality of life are higher than in the general population. The association between quality of life and depressive symptoms has been studied, although particularities regarding the relationship between these variables are still unknown. The objective of this study is to analyze the relationship between levels of Cognitive and So-

matic-Affective depressive symptomatology and quality of life in people with epilepsy. Seventy-two adult patients from the Video-EEG Unit of Ramos Mejía Hospital (2020-2022) were evaluated. Scales were administered to assess depressive symptomatology (BDI-II) and quality of life (QOLIE 31-P), along with a sociodemographic questionnaire. Significant negative associations were found between QOLIE-31P and dimensions of BDI-II. The somatic dimension of BDI predicted the QOLIE-31P score. These results highlight the impact of somatic depression on quality of life, expanding the aspects to consider when evaluating patients with epilepsy and gaining a better understanding of how their quality of life is affected.

Keywords

Epilepsy - Depression - Quality of life - QOLIE 31-P

BIBLIOGRAFÍA

- Abe, C., Denney, D., Doyle, A., Cullum, M., Adams, J., Pervin, G., Dave H, Dieppa M, Hays R, Agostini M & Ding, K. (2020). Comparison of psychiatric comorbidities and impact on quality of life in patients with epilepsy or psychogenic nonepileptic spells. *Epilepsy & Behavior*, 102, 106649. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.106649>
- American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. (1996). Beck depression inventory-II. Psychological assessment.
- Cramer, J. A., Perrine, K., Devinsky, O., Bryant-Comstock, L., Meador, K., & Hermann, B. (1998). Development and cross-cultural translations of a 31-item quality of life in epilepsy inventory. *Epilepsia*, 39 (1), 81-88. <https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1998.tb01278.x>
- Fisher, R. S., Boas, W. V. E., Blume, W., Elger, C., Genton, P., Lee, P., & Engel Jr, J. (2005). Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). *Epilepsia*, 46 (4), 470-472. <https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x>