

Trauma y violencia sexual en pacientes mujeres con crisis funcionales disociativas/no epilépticas psicógenas.

Lanzillotti, Alejandra Inés.

Cita:

Lanzillotti, Alejandra Inés (2023). *Trauma y violencia sexual en pacientes mujeres con crisis funcionales disociativas/no epilépticas psicógenas. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/603>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/GFF>

TRAUMA Y VIOLENCIA SEXUAL EN PACIENTES MUJERES CON CRISIS FUNCIONALES DISOCIATIVAS/NO EPILÉPTICAS PSICÓGENAS

Lanzillotti, Alejandra Inés

CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Las crisis funcionales disociativas/no epilépticas psicógenas (CFD/CNEP) son eventos episódicos, repentinos e involuntarios (paroxísticos) asociados a manifestaciones motoras, sensoriales, mentales o autonómicas. Se diagnostican tras descartar causas médicas y en su génesis y mantenimiento intervienen mecanismos psicológicos. Se ha postulado que estas crisis son esencialmente disociaciones que operan como un mecanismo psicológico defensivo para enfrentar los traumas. La violencia sexual es una causa importante de trauma psíquico con consecuencias graves en la salud mental, en particular en pacientes que sufren CFD/CNEP donde el trauma ha sido considerado etiopatogénico. En este trabajo se presentan resultados preliminares obtenidos en una muestra de pacientes mujeres con diagnóstico de CFD/CNEP asistidas en hospitales públicos de Buenos Aires. Se observó que el 80% de ellas presentaba antecedentes de vivencias traumáticas, destacándose el trauma por haber sufrido violencia sexual en más de la mitad (52.8%) de estos casos. Casi un tercio (31.6%) de las pacientes con este antecedente cumplía criterios para el diagnóstico de estrés pos-traumático y, en la misma proporción, presentaba antecedentes de conductas autolíticas. Se discuten las implicancias de estos resultados a fin de favorecer el abordaje, la atención clínica y el tratamiento psicológico en esta población de pacientes.

Palabras clave

Trauma - Violencia sexual - Crisis disociativas - Crisis no epilépticas - Mujeres

ABSTRACT

TRAUMA AND SEXUAL VIOLENCE IN FEMALE PATIENTS WITH FUNCTIONAL DISSOCIATIVE/PSYCHOGENIC NONEPILEPTIC SEIZURES

Functional Dissociative/Psychoogenic Nonepileptic Seizures (FDS/PNES) are episodic, sudden, and involuntary events associated with motor, sensory, mental, or autonomic manifestations. They are diagnosed after ruling out medical causes, and psychological mechanisms play a role in their genesis and maintenance. It has been postulated that these crises are essentially dissociations that operate as a defensive psychological mechanism to cope with trauma. Sexual violence is a significant cause of psychologi-

cal trauma with severe consequences on mental health, particularly in patients experiencing FDS/PNES, where trauma has been considered etiopathogenic. This study presents preliminary results obtained from a sample of female patients diagnosed with FDS/PNES receiving care in public hospitals in Buenos Aires. It was observed that 80% of them had a history of traumatic experiences, with sexual violence being the prominent trauma in over half (52.8%) of these cases. Nearly one-third (31.6%) of patients with this history met criteria for post-traumatic stress disorder diagnosis, and an equal proportion had a history of self-harming behaviors. The implications of these results are discussed in order to promote comprehensive approaches, clinical care, and psychological treatment for this patient population.

Keywords

Trauma - Sexual violence - Functional/dissociative seizures - Psychogenic non-epileptic - Women

BIBLIOGRAFÍA

- Asadi-Pooya, A., & Bahrami, Z. (2019). Sexual abuse and psychogenic nonepileptic seizures. *Neurological Sciences*, 1-4.
- Brown, R. J., & Reuber, M. (2016). Psychological and psychiatric aspects of psychogenic non epileptic seizures (PNES): a systematic review. *Clinical Psychology Review*, 45, 157-182.
- Fiszman, A., Alves-Leon, S. V., Nunes, R. G., D'Andrea, I., & Figueira, I. (2004). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. *Epilepsy & Behavior*; 5, 818-825.
- Myers, L., Perrine, K., Lancman, M., Fleming, M., & Lancman, M. (2013). Psychological trauma in patients with psychogenic nonepileptic seizures: Trauma characteristics and those who develop PTSD. *Epilepsy & Behavior*, 28, 121-126.
- Myers, L., Trobliger, R., Bortnik, K., & Lancman, M. (2018). Are there gender differences in those diagnosed with psychogenic nonepileptic seizures?. *Epilepsy & Behavior*, 78, 161-165.
- Reuber, M. (2008). Psychogenic nonepileptic seizures: answers and questions. *Epilepsy & Behavior*, 12, 622-35.
- Thomas, A. A., Preston, J., Scott, R. C., & Bujarski, K. A. (2013). Diagnosis of probable psychogenic nonepileptic seizures in the outpatient clinic: does gender matter?. *Epilepsy & Behavior*, 29, 295-297.