

Presencia de la conducta suicida en bulimia y anorexia nerviosa.

Sosa Leguizamón, Juan Andrés, García, Andrea y Britez Duarte, Héctor.

Cita:

Sosa Leguizamón, Juan Andrés, García, Andrea y Britez Duarte, Héctor (2023). *Presencia de la conducta suicida en bulimia y anorexia nerviosa. XV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXX Jornadas de Investigación. XIX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. V Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional V Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires*.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-009/893>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ebes/Xvg>

PRESENCIA DE LA CONDUCTA SUICIDA EN BULIMIA Y ANOREXIA NERVIOSA

Sosa Leguizamón, Juan Andrés; Garcia, Andrea; Britez Duarte, Héctor
Villarrica, Paraguay.

RESUMEN

Introducción: La conducta suicida se puede clasificar en dos categorías: directa e indirecta. La conducta suicida directa abarca la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio consumado, mientras que la conducta suicida indirecta incluye comportamientos de riesgo que no necesariamente buscan el fin de la vida. La conducta suicida, en todas sus dimensiones, suele estar presente con frecuencia en los trastornos alimentarios en general. **Objetivo principal:** Analizar la presencia de la conducta suicida en individuos diagnosticados con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. **Metodología:** Revisión bibliográfica mediante búsqueda en las bases de datos científicas especializadas. Se seleccionaron los artículos científicos publicados entre 2013 y 2023. **Resultados:** Se encontró que los intentos de suicidio son más frecuentes en los trastornos alimentarios que implican purga, como la bulimia nerviosa y el subtipo purgativo de la anorexia nerviosa. La ideación suicida es más común en la bulimia nerviosa que en la anorexia nerviosa. Además, la anorexia nerviosa presenta la tasa de mortalidad más alta por suicidio entre los trastornos alimentarios, seguida de la bulimia nerviosa. **Conclusión:** Estos hallazgos subrayan la necesidad de una detección temprana y una intervención adecuada en estos trastornos, abordando salud física y mental.

Palabras clave

Bulimia nerviosa - Anorexia nerviosa - Conducta suicida - Trastornos alimentarios

ABSTRACT

PRESENCE OF SUICIDAL BEHAVIOR IN BULIMIA AND ANOREXIA NERVOSEA
Introduction: Suicidal behavior can be classified into two categories: direct and indirect. Direct suicidal behavior encompasses suicidal ideation, suicide attempt, and completed suicide, while indirect suicidal behavior includes risk behaviors that do not necessarily seek to end one's life. Suicidal behavior, in all its dimensions, is frequently present in eating disorders in general. **Main objective:** To analyze the presence of suicidal behavior in individuals diagnosed with anorexia nervosa and bulimia nervosa. **Methodology:** Bibliographic review through a search in specialized scientific databases. Only scientific articles published between 2013 and 2023 were selected. **Results:** Suicide attempts appear to be more frequent in eating disorders that

involve purging, such as bulimia nervosa and the purgative subtype of anorexia nervosa. Suicidal ideation is more common in bulimia nervosa than in anorexia nervosa. In addition, anorexia nervosa has the highest suicide mortality rate among eating disorders, followed by bulimia nervosa. **Conclusion:** These findings highlight the need for early detection and appropriate intervention in these disorders, addressing physical and mental health.

Keywords

Bulimia nervosa - Anorexia nervosa - Suicidal behavior - Eating disorders

BIBLIOGRAFÍA

- Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2008). *Psicología anormal: un enfoque integral*. Cengage Learning Editores.
- Claes, L., Fernández-Aranda, F., Jimenez-Murcia, S., Botella, C., Casanueva, F. F., De la Torre, R., ... & Menchón, J. M. (2013). Co-occurrence of non-suicidal self-injury and impulsivity in extreme weight conditions. *Personality and Individual Differences*, 54(1), 137-140. doi: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.07.035>
- Cliffe, C., Shetty, H., Himmerich, H., Schmidt, U., Stewart, R., & Dutta, R. (2020). Suicide attempts requiring hospitalization in patients with eating disorders: A retrospective cohort study. *International journal of eating disorders*, 53(5), 728-735. doi: <https://doi.org/10.1002/eat.23240>
- Crow, S. J., Swanson, S. A., Le Grange, D., Feig, E. H., & Merikangas, K. R. (2014). Suicidal behavior in adolescents and adults with bulimia nervosa. *Comprehensive Psychiatry*, 55(7), 1534-1539. doi: <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.05.021>
- Fichter, M. M., & Quadflieg, N. (2016). Mortality in eating disorders—results of a large prospective clinical longitudinal study. *International Journal of Eating Disorders*, 49(4), 391-401. doi: <https://doi.org/10.1002/eat.22501>
- Guarín, M. R., Malagón, N. R., Rueda, J. G., & Garzón, D. F. (2013). Factores asociados con intento de suicidio y comportamientos de autolesión no suicida en pacientes con trastornos del comportamiento alimentario. *Revista colombiana de psiquiatría*, 43, 19-26. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2013.11.007>
- Huas, C., Godart, N., Caille, A., Pham-Scottez, A., Foulon, C., Divac, S. M., ... & Rouillon, F. (2013). Mortality and its predictors in severe bulimia nervosa patients. *European Eating Disorders Review*, 21(1), 15-19. doi: <https://doi.org/10.1002/erv.2178>

- Joiner, T. E., Robison, M., McClanahan, S., Riddle, M., Manwaring, J., Rienecke, R. D., ... & Blalock, D. V. (2022). Eating disorder behaviors as predictors of suicidal ideation among people with an eating disorder. *International Journal of Eating Disorders*, 55(10), 1352-1360. doi: <https://doi.org/10.1002/eat.23770>
- Mayes, S. D., Fernandez-Mendoza, J., Baweja, R., Calhoun, S., Mahr, F., Aggarwal, R., & Arnold, M. (2014). Correlates of suicide ideation and attempts in children and adolescents with eating disorders. *Eating Disorders*, 22(4), 352-366. doi: <https://doi.org/10.1080/10640266.2014.915694>
- Perkins, N. M., & Brausch, A. M. (2019). Body dissatisfaction and symptoms of bulimia nervosa prospectively predict suicide ideation in adolescents. *International journal of eating disorders*, 52(8), 941-949. doi: <https://doi.org/10.1002/eat.23116>
- Portzky, G., van Heeringen, K., & Vervaet, M. (2014). Attempted suicide in patients with eating disorders. *Crisis*. doi: <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000275>
- Ruuska, J., Kaltiala-Heino, R., Rantanen, P., & Koivisto, A. M. (2005). Psychopathological distress predicts suicidal ideation and self-harm in adolescent eating disorder outpatients. *European child & adolescent psychiatry*, 14, 276-281. doi: <https://doi.org/10.1007/s00787-005-0473-8>