

XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2008.

# **Evaluación psicológica de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.**

Casullo, Maria Martina, Quesada, Silvia, Mele, Silvia Viviana y Morandi, Paola.

Cita:

Casullo, Maria Martina, Quesada, Silvia, Mele, Silvia Viviana y Morandi, Paola (2008). *Evaluación psicológica de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-032/669>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/efue/avS>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Casullo, María Martina; Quesada, Silvia; Mele, Silvia Viviana; Morandi, Paola

Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

## RESUMEN

se presentan resultados preliminares obtenidos a partir de la administración de la escala PERI y del Listado de Síntomas SCL 90-R a una muestra de estudiantes universitarios (N=200), que concurren al Servicio de Psicología de la Dirección de Salud de la Universidad de Buenos Aires. Se incluyeron preguntas sobre datos sociodemográficos. Estos resultados indican que el 20% de los estudiantes evaluados puede ser considerado "en riesgo". Se verifican diferencias estadísticamente significativas para el puntaje total de PERI y todas o algunas de las dimensiones del Listado de Síntomas SCL 90-R según tomamos las variables sexo, edad recodificada, facultad a la que asiste y la pertenencia o no al grupo considerado "en riesgo". Existen asociaciones positivas, estadísticamente significativas entre cada una de las dimensiones del Listado de Síntomas SCL 90-R y el puntaje total de PERI.

## Palabras clave

Evaluación Despijaje Riesgo Psicopatología

## ABSTRACT

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF BUENOS AIRES UNIVERSITY STUDENTS

Preliminary results, got administering the scale PERI and the Symptoms Check List 90-R to a sample of university students (N=200) who concurred to the Health Psychology Service of the University of Buenos Aires, are presented. Questions about sociodemographic data were included. These results indicate that 20% of the evaluated students can be considered "at risk". Statistically significant differences are verified for the PERI Total Score and all or some of the Symptoms Check List 90-R dimensions according to how we took the variables sex, recodified age, college attended and whether it belongs or not to the group considered "at risk". Statistically significant positive associations exist between each dimension of the SCL 90-R and PERI Total Score.

## Key words

Assessment Screening Risk Psychopathology

## OBJETIVOS

1. Determinar el porcentaje de alumnos que pueden ser considerados "en riesgo" de acuerdo al puntaje obtenido en la Escala PERI.
2. Analizar si existen diferencias estadísticamente significativas para el puntaje total de la Escala PERI y para las dimensiones del Listado de Síntomas SCL 90-R según las variables sexo, edad y facultad a la que concurre.
3. Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para el puntaje total de la Escala PERI y para las dimensiones del Listado de Síntomas SCL 90-R según se trate de alumnos considerados "en riesgo" o no.
4. Determinar si existen asociaciones entre el puntaje total de la Escala PERI y las dimensiones del Listado de Síntomas SCL 90-R.

## MÉTODO

**Diseño:** descriptivo, exploratorio.

**Muestra:** intencional. N= 200. El 48% es de sexo masculino y el 52% es de sexo femenino. Franja de edad: 18 a 55 años; edad= 21,04; d.t.= 5,92. En la de Ciudad de Buenos Aires nació el 53% de la muestra, en el Conurbano bonaerense el 18%, en la provincia de Buenos Aires el 20%, en otras provincias el 7% y en otros países el 2%. El 43% reside en la Ciudad de Buenos Aires, el 27% en el Conurbano y 30% en la provincia de Buenos Aires.

Se agruparon las facultades en función del porcentaje de concurrencia a las mismas, así, el 26,5% estudia Medicina, Odontología, Farmacia y Bioquímica; el 25% Económicas, el 21% Sociales, Filosofía y Psicología, el 15,5% Derecho y el 12% Veterinaria, Agronomía, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Exactas y Naturales.

## Instrumentos y procedimiento

La Escala PERI (Psychiatric Epidemiological Research Interview), diseñada originalmente en la Universidad de Columbia de Nueva York, por Dohrenwed (1980), ha sido adaptada a nuestro medio y son numerosos los estudios realizados mediante su aplicación. Su validez y confiabilidad han sido verificadas en estudios con alumnos argentinos ingresantes a profesorado, en pacientes con infarto de miocardio, en operadores de una empresa telefónica, en estudiantes adolescentes. (Casullo, 1992). La versión abreviada está integrada por 33 ítems con tres opciones de respuesta (a menudo, pocas veces y nunca). De acuerdo a la experiencia de trabajos anteriores, para este estudio algunos de ellos han sido modificados, lo que favoreció el interés de los participantes en responderla. El puntaje de corte es 5 y 25, o sea que por debajo de 5 y por encima de 25 se ubicarían los casos de riesgo.

El Listado de Síntomas SCL 90-R evalúa patrones de síntomas y se utiliza tanto en diagnóstico clínico como en tareas comunitarias. Lo integran 90 ítems que se responden en una escala de 0 a 4 (de nada a mucho). Se lo evalúa en función de nueve dimensiones primarias (Somatizaciones; Obsesiones y Compulsiones; Sensitividad interpersonal; Depresión; Ansiedad; Hostilidad; Ansiedad Fóbica; Ideación Paranoide y Psicoticismo), y tres índices de malestar psicológico (Global de Severidad; Positivo de Malestar y Total de síntomas positivos).

## RESULTADOS

- Se verificó que el 20% de los estudiantes evaluados puede ser considerado "en riesgo" y se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ellos y el grupo de "no riesgo" en el puntaje de PERI y todas las dimensiones de SCL 90-R, salvo en Hostilidad.
- Se encontraron diferencias estadísticamente significativas según el sexo de los evaluados en el puntaje total de PERI y las dimensiones Somatizaciones y Depresión del SCL 90-R, a favor del grupo de mujeres.
- En cuanto a la edad, (recodificada en tres grupos: 18 años, 19 a 24 años y 25 y más), se hallaron diferencias en PERI y todas las dimensiones de SCL, menos en Somatizaciones, a favor de los grupos más jóvenes.
- No se hallaron diferencias según las facultades a las que concurren.
- Se verificaron asociaciones positivas, estadísticamente significativas, entre cada una de las dimensiones del Listado SCL90-R y el puntaje total de PERI.

## BIBLIOGRAFÍA

- CASULLO, M.M. (1992). Las técnicas psicométricas y el diagnóstico psicopatológico. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- CASULLO, M.M. (1998). Adolescentes en Riesgo. Buenos Aires: Paidós.
- DEROGATIS, L. (1994). SCL-90-R. Symptom Checklist-90-R. Administration, Scoring and Procedures Manual. Minneapolis: National Computer System.
- DOHRENEWEND, B.P. (1980). Non specific psychological distress and other dimensions of psychopathology, Archives of General Psychiatry, 37.
- VERNON, S. y ROBERTS, R. (1981). Measuring non specific psychological distress and other dimensions of psychopathology. Archives of General Psychiatry, 38.