

VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2014.

Uso de drogas psicoactivas y uso del condón en el sexo vaginal en estudiantes universitarios.

Disogra, Carlos Esteban y Cosacov, Eduardo.

Cita:

Disogra, Carlos Esteban y Cosacov, Eduardo (2014). *Uso de drogas psicoactivas y uso del condón en el sexo vaginal en estudiantes universitarios. VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-035/243>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ecXM/XTM>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

USO DE DROGAS PSICOACTIVAS Y USO DEL CONDÓN EN EL SEXO VAGINAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Disogra, Carlos Esteban; Cosacov, Eduardo

Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

RESUMEN

Se presenta una evaluación de la asociación entre el uso de drogas psicoactivas y el uso del condón en el sexo vaginal en estudiantes universitarios. El análisis de datos consistió en varios análisis basados en la prueba de chi cuadrado entre el uso de diferentes drogas psicoactivas antes y/o durante el encuentro sexual y el uso del condón en el sexo vaginal. Se produce menor uso del condón en el sexo vaginal cuando se reporta el uso de tabaco o cocaína antes y/o durante el encuentro sexual. Se discuten las implicaciones de los resultados para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (HIV).

Palabras clave

Uso de drogas, Uso del condón, Estudiantes universitarios

ABSTRACT

PSYCHOACTIVE DRUGS USE AND CONDOM USE IN VAGINAL SEX IN COLLEGE STUDENTS

An evaluation of the association between the use of psychoactive drugs and condom use in vaginal sex in college students is presented. Data analysis consisted of several analyzes based on the chi-square test between the use of different psychoactive drugs before and/or during sexual intercourse and condom use in vaginal sex. Lower condom use in vaginal sex takes place when the subjects reported the use of tobacco or cocaine before and/or during the sexual encounter. The implications of the results for prevention of human immunodeficiency virus (HIV) are discussed.

Key words

Drugs use, Condom use, College students

Introducción

Sabido es que existe una epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (HIV) en el mundo y en Argentina (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 2012). La forma de prevención de la transmisión por vía sexual del virus es el uso sostenido del condón en todas las conductas sexuales y con todos los compañeros sexuales. El problema de la prevención de la transmisión sexual del virus ha sido explicar y controlar la conducta del uso del condón. Aunque originariamente formulada para explicar un espectro amplio de la conducta social, una de las teorías que se ha mostrado más capaz de predecir el uso del condón (Sheeran, Abraham, & Orbell, 1999) es la teoría de la acción razonada de Fishbein, Middlestadt, & Hitchcock (1994) y su descendiente directo, la teoría de la conducta planificada de Ajzen (1991; 2002). Se han reportado varias corroboraciones de esta teoría, de su capacidad de predecir el uso del condón en Argentina, las cuales posibilitan el diseño de intervenciones HIV preventivas. Las mismas son necesarias porque el uso del condón se da en aproximadamente sólo la mitad de los encuentros sexuales en esta muestras de estudiantes universitarios

(Disogra, Cosacov, & Bertotti, 2006; Disogra, Cosacov, & Bertotti, 2008; Disogra, 2012). Pero la teoría de la acción razonada no incluye el uso de drogas psicoactivas. Por otro lado, los meta-análisis sobre los predictores del uso del condón muestran: 1) no suele incluirse en las investigaciones el uso de drogas psicoactivas al modelo predictor del uso del condón, por ejemplo, Sheeran, Abraham, & Orbell (1999) en su meta-análisis sobre predictores del uso del condón, listan 44 variables evaluadas como posibles predictores del uso del condón en 121 investigaciones pero entre esas 44 variables no figura el consumo de ninguna droga y 2) Leigh (2002) en su meta-análisis sobre los efectos del alcohol en el uso del condón, concluye que aún cuando se asume que el consumo de alcohol disminuiría el uso del condón, las investigaciones han mostrado resultados inconsistentes. Por ello, en un intento de decidir si una futura intervención HIV preventiva en esta población debería o no incluir un componente específico del uso de drogas, en el presente trabajo se explora una posible asociación entre el uso de drogas psicoactivas y uso del condón en estudiantes universitarios.

Objetivos Generales y Específicos

El objetivo general es buscar mejores modelos predictivos del uso del condón para informar cuáles deberían ser las variables a intentar modificar en futuras intervenciones HIV preventivas. El objetivo específico es explorar empíricamente una posible asociación entre el uso de drogas psicoactivas antes y/o durante un encuentro sexual y uso del condón en el sexo vaginal en estudiantes universitarios.

Materiales y Métodos Muestra

La muestra es accidental y está compuesta por 2315 alumnos universitarios de Córdoba. La media de la edad resultó 21,06 años y mediana 19. El 75,3% de sexo femenino y 24,1% masculino. El 94,7 se autoreportó heterosexual, el 1,6% bisexual, el 1,5% gay y el 0,5% lesbiana. Si bien la muestra está sesgada por edad dado que la mayoría de los sujetos son jóvenes, en realidad este sesgo no es incompatible con las poblaciones necesitadas de prevención de HIV, pues los jóvenes son un grupo de mayor riesgo relativo (LU-SIDA, 2003).

Medición de las variables Dependientes

La variable dependiente es el *uso del condón (masculino) para sexo vaginal*, se mide dicotómica en el último encuentro sexual y tiene dos categorías: 1) con condón y 2) sin condón. Se pide al sujeto que indique por sí o por no, tanto si tuvo sexo vaginal con condón como si lo tuvo sin condón.

El uso del condón medido con autoreporte resultó validado por el enorme experimento de Kamb, Fishbein, Douglas, Rhodes, Rogers, et al (1998), quienes testearon los efectos de 3 tratamientos HIV preventivos en una muestra de 5758 personas que consultaron un servicio clínico de enfermedades sexualmente transmisibles (ETS) en Estados Unidos de América, con mediciones de post-test y varias de seguimiento de dos variables dependientes: uso del condón

(medida con autoreporte) y diagnóstico de alguna ETS (medida con examen de laboratorio). En el post-test y seguimiento, los grupos difirieron en la proporción de sujetos que reportó usar el condón siempre, aquellos grupos con mayor uso del condón fueron los grupos con menor incidencia de ETS, avalando no sólo los efectos de los tratamientos preventivos, sino también validando a través del examen de laboratorio de ETS la medición del uso del condón con autoreporte (Kamb, Fishbein, Douglas, Rhodes, Rogers, et al, 1998, pp. 1165-1166).

Independientes

Las variables independientes son el *consumo de drogas psicoactivas inmediatamente antes y/o durante la última relación sexual*. Se preguntó a los sujetos, "Inmediatamente antes y/o durante tu última relación sexual, ¿consumiste vos alguna droga, cigarrillo o alcohol?" con opciones de respuesta: "Sí" y "No". A quienes respondieron "Sí", se les preguntó: "En esta pregunta podés marcar todas las opciones que sean aplicables. Inmediatamente antes y/o durante tu última relación sexual, ¿qué consumiste vos?", con opciones de respuesta: "Tabaco", "Alcohol", "Marihuana", "Cocaína", "Benzodiacepinas", "Anfetaminas", "Éxtasis" y "Heroína". Se incluyeron drogas de sabido uso difundido y drogas prácticamente no usadas deliberadamente, para evaluar si se reportaba su uso.

Aspectos éticos

La participación en la investigación fue voluntaria y anónima y se presentó a los sujetos el consentimiento informado por escrito. Para reforzar la participación se les ofreció por la misma un punto comodín, válido académicamente. Para no forzar a quienes no quieren participar, se ofreció el punto comodín también por la sola presentación de una monografía sobre el tema "Metodología de la investigación científica". Se agradeció a los sujetos por su participación. Se proveyó a los sujetos de una dirección de correo electrónico para formular preguntas y obtener respuestas después de su participación. Nadie usó esta posibilidad. No hubo dificultades en la realización de la investigación.

Análisis de datos

En el análisis de datos se aprovecharon tanto los datos recolectados en este proyecto como aquellos del proyecto anterior del equipo (Disogra, Cosacov, & Bertotti, 2006; Disogra, Cosacov, & Bertotti, 2008; Disogra, 2012).

Primero, se practicaron análisis descriptivos para determinar tanto qué uso de drogas psicoactivas se produce antes y/o durante la última relación sexual de los sujetos, cuanto qué uso del condón hay en el sexo vaginal.

Segundo, dada la naturaleza exploratoria de este trabajo, se practicaron análisis basados en la prueba de chi cuadrado entre las variables uso del condón en el sexo vaginal en el último encuentro sexual y cada una de las cuatro drogas psicoactivas más consumidas: "Tabaco", "Alcohol", "Marihuana" y "Cocaína". Las drogas menos usadas son tan infrecuentes que no permiten un análisis estadístico, aún cuando la muestra es de tamaño generoso. Nunca se usó la corrección por continuidad en la prueba de chi cuadrado porque la frecuencia esperada nunca resultó inferior a 5.

RESULTADOS

Descriptivos

En cuanto al consumo de drogas psicoactivas, el 39,2% de los sujetos dijo haberlas consumido inmediatamente antes y/o durante la última relación sexual y el 60,8% dijo no haber consumido. En

cuanto a la droga consumida resultó: "Tabaco" 78,9%, "Alcohol" 54,5%, "Marihuana" 16,9%, "Cocaína" 1,3%, "Benzodiacepinas" 0,5%, "Anfetaminas" 0,2%, "Éxtasis" 0,5% y "Heroína" 0,0% (la suma puede resultar superior a 100% porque se pidió a los sujetos que marquen todas las opciones aplicables a su caso).

En cuanto al uso del condón en el sexo vaginal en el último encuentro sexual, el 46,2% de los sujetos dijo "Sí" haberlo usado y el 53,8% dijo "No".

Inferenciales

Tabaco. Las proporciones expresadas en porcentaje de la tabla 2 x 2 resultaron: tabaco si y condón no 46,1%, tabaco si y condón si 53,9%, tabaco no y condón no 28,3%, tabaco no y condón si 71,7%, chi cuadrado = 9,49, gl = 1 y p = 0,002. Hay una asociación entre el consumo de tabaco y el uso del condón en el sexo vaginal, cuando se consume tabaco tiende a usarse el condón en menor proporción de casos.

Alcohol. Las proporciones expresadas en porcentaje de la tabla 2 x 2 resultaron: alcohol si y condón no 42,0%, alcohol si y condón si 58,0%, alcohol no y condón no 42,4%, alcohol no y condón si 57,6%, chi cuadrado = 0,009, gl = 1 y p = ns. No hay una asociación entre el consumo de alcohol y el uso del condón en el sexo vaginal.

Marihuana. Las proporciones expresadas en porcentaje de la tabla 2 x 2 resultaron: marihuana si y condón no 45,8%, marihuana si y condón si 54,2%, marihuana no y condón no 41,6%, marihuana no y condón si 58,4%, chi cuadrado = 0,5, gl = 1 y p = ns. No hay una asociación entre el consumo de marihuana y el uso del condón en el sexo vaginal.

Cocaína. Las proporciones expresadas en porcentaje de la tabla 2 x 2 resultaron: cocaína si y condón no 80,0%, cocaína si y condón si 20,0%, cocaína no y condón no 41,8%, cocaína no y condón si 58,2%, chi cuadrado = 2,95, gl = 1 y p = 0,09. Hay una asociación entre el consumo de cocaína y el uso del condón en el sexo vaginal, cuando se consume cocaína tiende a usarse el condón en menor proporción de casos.

Discusión

Según el análisis de datos se desprenden cuatro conclusiones: 1) en cuanto al uso del condón en el sexo vaginal en el último encuentro sexual, prácticamente la mitad de los sujetos dijo "Sí" haberlo usado, 2) una minoría grande del orden del 40% de la muestra dijo haber consumido drogas psicoactivas inmediatamente antes y/o durante la última relación sexual, 3) las drogas psicoactivas más usadas resultaron "Tabaco" casi 80%, "Alcohol" casi 50%, "Marihuana" casi 20%, "Cocaína" aproximadamente 1% y 4) se produce un menor uso del condón en el sexo vaginal cuando se reporta el uso de tabaco o cocaína antes y/o durante el encuentro sexual en estudiantes universitarios. Son importantes estos datos toda vez que se quiera diseñar una intervención HIV preventiva para esta población, incorporando a la misma un componente específico para intentar modificar el uso de drogas psicoactivas antes y/o durante un encuentro sexual en estudiantes universitarios con el objetivo de incrementar el uso del condón. Queda claro que la intervención debería atender al consumo de tabaco y cocaína antes y/o durante los encuentros sexuales. Lo que no queda claro, y amerita nuevas investigaciones, es la naturaleza del tratamiento en sí mismo. Este componente centrado en las drogas psicoactivas puede ser una parte valiosa en la complementación de una intervención HIV preventiva basada principalmente en la teoría de la conducta planificada, la cual ha mostrado ya su capacidad de predicción del uso del condón en esta población.

BIBLIOGRAFIA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 1-20.

Disogra, C.E. (2012). La capacidad predictiva de normas sociales, actitudes y control conductual percibido del uso del condón en función del individualismo-colectivismo (pp. 67-70). En el tomo *Psicología de la Salud, Epidemiología y Prevención de las Memorias del IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XIX Jornadas de Investigación y VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Disogra, C. E., Bertotti, G. H. & Cosacov, N. E. (2008). Predictores del uso del condón en el sexo vaginal con la teoría de la conducta planificada en estudiantes universitarios femeninos (pp. 221-223). En el tomo II de las *Memorias de las XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Disogra, C. E., Cosacov, N. E. & Bertotti, G. H. (2006). Predictores del uso del condón en el sexo vaginal con las teorías de la acción razonada y de la conducta planificada en estudiantes universitarios (pp. 42-44). En el tomo II de las *Memorias de las XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. ISSN 1667-6750.

Fishbein, M., Middlestadt, S. E. & Hitchcock, P. J. (1994). Using information to change sexually transmitted diseases-related behaviors: An analysis based on the theory of reasoned action. In R. J. DiClemente, & J. L. Peterson (Comp.), *Preventing AIDS: Theories and Methods of Behavioral Interventions* (pp. 61-78). New York, NY: Plenum Press.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2012). *Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2012*. WHO Library Cataloguing in Publication Data. ISBN 978-92-9173-592-1 (Digital version).

Kamb, M. L., Fishbein, M., Douglas, J. M. Jr, Rhodes, F., Rogers, J., Bolan, G., Zenilman, J., Hoxworth, T., Malotte, C. K., Latesta, M., Kent, C., Lentz, A., Graziano, S., Byers, R. H., Peterman, T. A. & the Project RESPECT Study Group. (1998). Efficacy of risk-reduction counseling to prevent human immunodeficiency virus and sexually transmitted diseases: A randomized controlled trial. *Journal of the American Medical Association*, 280(13), 1161-1167.

Leigh, B. C. (2002). Alcohol and Condom Use: A Meta-Analysis of Event-Level Studies. *Sexually Transmitted Diseases*, 29, 476-482.

LUSIDA (Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS, 2003). *Boletín sobre el SIDA en la Argentina*. Año X, Número 22, Octubre de 2003. Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina.

Sheeran, P., Abraham, C. & Orbell, S. (1999). Psychosocial correlates of heterosexual condom use: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 125(1), 90-132.