

Trauma y violencia sexual en pacientes mujeres con crisis epilépticas y crisis funcionales/disociativas.

Lanzillotti, Alejandra Inés.

Cita:

Lanzillotti, Alejandra Inés (2024). *Trauma y violencia sexual en pacientes mujeres con crisis epilépticas y crisis funcionales/disociativas. XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-048/563>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/evo3/muX>



TRAUMA Y VIOLENCIA SEXUAL EN PACIENTES MUJERES CON CRISIS EPILEPTICAS Y CRISIS FUNCIONALES/DISOCIATIVAS

Lanzillotti, Alejandra Inés

CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Las crisis epilépticas (CE) son descargas neuronales anormales que interrumpen la actividad eléctrica del cerebro. En cambio, las crisis funcionales/disociativas (CFD) son eventos episódicos, involuntarios y repentinos con manifestaciones motoras, sensoriales, mentales o autonómicas, diagnosticados tras descartar causas médicas. Este estudio analiza una muestra de 95 mujeres (50 con CE y 45 con CFD) atendidas en hospitales públicos de Buenos Aires. Tras firmar un consentimiento informado, las participantes completaron cuestionarios sociodemográficos y entrevistas clínicas semiestructuradas. Al analizar los resultados en cada grupo diagnóstico, se encontró una mayor proporción de trauma en mujeres con CFD (80% frente a 30%), destacando el trauma por violencia sexual (VS) como el más prevalente (40% frente a 10%). En ambos grupos, la VS se asoció significativamente con el estrés postraumático y antecedentes de intentos de suicidio. En mujeres con CE, la VS también se asoció con antecedentes de internación psiquiátrica y consumo de psicofármacos. Estos resultados subrayan las graves implicaciones de la VS para la salud mental de las mujeres y resaltan la importancia de un enfoque preventivo para mitigar sus efectos.

Palabras clave

Crisis funcionales disociativas - Crisis epilepticas - Trauma - Violencia sexual - Mujeres

ABSTRACT

TRAUMA AND SEXUAL VIOLENCE IN FEMALE PATIENTS WITH EPILEPTIC SEIZURES AND FUNCTIONAL/DISOCIATIVE SEIZURES

Epileptic seizures (ES) are abnormal neuronal discharges that disrupt the brain's electrical activity. In contrast, functional/dissociative seizures (FDS) are episodic, involuntary, and sudden events with motor, sensory, mental, or autonomic manifestations, diagnosed after ruling out medical causes. This study analyzes a sample of 95 women (50 with ES and 45 with FDS) treated in public hospitals in Buenos Aires. After signing informed consent, the participants completed sociodemographic questionnaires and semi-structured clinical interviews. Analyzing the results in each diagnostic group, a higher proportion of trauma was found in women with FDS (80% vs. 30%), highlighting sexual violence (SV) as the most prevalent trauma (40% vs. 10%). In

both groups, SV was significantly associated with post-traumatic stress and a history of suicide attempts. In women with ES, SV was also associated with a history of psychiatric hospitalization and psychotropic drug use. These results underscore the severe implications of SV for women's mental health and highlight the importance of a preventive approach to mitigate its effects.

Keywords

Dissociative functional seizures - Epileptic seizures - Trauma - Sexual violence - Women

BIBLIOGRAFÍA

- Asadi-Pooya, A., & Bahrami, Z. (2019). Sexual abuse and psychogenic nonepileptic seizures. *Neurological Sciences*, 1-4. <https://doi.org/10.1007/s10072-019-03887-3>
- Dickinson, P., & Looper, K. J. (2012). Psychogenic nonepileptic seizures: a current overview. *Epilepsia*, 53(10), 1679-1689. <https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2012.03606.x>
- Fiszman, A., Alves-Leon, S. V., Nunes, R. G., D'Andrea, I., & Figueira, I. (2004). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. *Epilepsy & Behavior*; 5(6), 818-825. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2004.09.002>
- Myers, L., Perrine, K., Lancman, M., Fleming, M., & Lancman, M. (2013). Psychological trauma in patients with psychogenic nonepileptic seizures: Trauma characteristics and those who develop PTSD. *Epilepsy & Behavior*, 28(1), 121-126. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.03.033>
- Myers, L., Trobliger, R., Bortnik, K., & Lancman, M. (2018). Are there gender differences in those diagnosed with psychogenic nonepileptic seizures? *Epilepsy & Behavior*, 78, 161-165. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.10.019>
- Nimmo-Smith, V., Brugha, T. S., Kerr, M. P., McManus, S., & Rai, D. (2016). Discrimination, domestic violence, abuse, and other adverse life events in people with epilepsy: Population-based study to assess the burden of these events and their contribution to psychopathology. *Epilepsia*, 57(11), 1870-1878. <https://doi.org/10.1111/epi.13561>
- Rosenberg, H. J., Rosenberg, S. D., Williamson, P. D., & Wolford, G. L. (2000). A Comparative Study of Trauma and Posttraumatic Stress Disorder Prevalence in Epilepsy Patients and Psychogenic Nonepileptic Seizure Patients. *Epilepsia*, 41(4), 447-452. <https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb00187.x>

Thomas, A. A., Preston, J., Scott, R. C., & Bujarski, K. A. (2013). Diagnosis of probable psychogenic nonepileptic seizures in the outpatient clinic: Does gender matter? *Epilepsy & Behavior*, 29(2), 295-297. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.08.006>

Yang, T., Roberts, C., Winton-Brown, T., Lloyd, M., Kwan, P., O'Brien, T. J., Velakoulis, D., Rayner, G., & Malpas, C. B. (2022). Childhood trauma in patients with epileptic vs nonepileptic seizures. *Epilepsia*, 64(1), 184-195. <https://doi.org/10.1111/epi.17449>