

XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2024.

Dolor crónico y Trastorno Bipolar: revisión narrativa de la comorbilidad clínica.

Goldschmidt, Micaela, Fischer, Romina, Aguiar, Karen y Rosales, Ma. Guadalupe.

Cita:

Goldschmidt, Micaela, Fischer, Romina, Aguiar, Karen y Rosales, Ma. Guadalupe (2024). *Dolor crónico y Trastorno Bipolar: revisión narrativa de la comorbilidad clínica*. XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-048/601>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/evo3/471>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

DOLOR CRÓNICO Y TRASTORNO BIPOLAR: REVISIÓN NARRATIVA DE LA COMORBILIDAD CLÍNICA

Goldschmidt, Micaela; Fischer, Romina; Aguiar, Karen; Rosales, Ma. Guadalupe
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Se define al dolor crónico (DC) como un dolor sostenido, recurrente por al menos 3 meses (Narvaez Tamayo, et al., 2024) que clínicamente se asocia a trastornos anímicos tales como depresión y ansiedad (Rayner, et al., 2016; Arango-Dávila & Rincón-Hoyos, 2018). No obstante, existe escasa literatura e investigaciones que exploren asociación entre dolor crónico y trastorno bipolar (TB), caracterizado por períodos de depresión y de manía/hipomanía (Vieta et al., 2018). Objetivo: El objetivo del presente estudio consta de una revisión narrativa de la prevalencia de bipolaridad de distintos cuadros de dolor crónico en pacientes con trastorno bipolar, así como identificar variables asociadas al nivel de funcionalidad e intensidad del dolor. Metodología: Se realizará una búsqueda en bases de datos científicas Pubmed, utilizando las palabras claves: “chronic pain”, “bipolar disorder”; se incluirán artículos de revisión narrativa y sistemática de 2014 a 2024 y artículos originales de 2019 a 2024. Se excluyen investigaciones cualitativas. Resultados: En la etapa de screening, se encontraron 23 artículos; a partir del filtraje por criterios de exclusión, se incluyeron 10 artículos en la muestra final. La prevalencia de DC en personas con posible TB se estima en 23,7% (Stubbs et al., 2015).

Palabras clave

Dolor crónico - Trastorno bipolar - Comorbilidad - Psicología de la Salud

ABSTRACT

CHRONIC PAIN AND BIPOLAR DISORDER:
NARRATIVE REVIEW OF CLINICAL COMORBILITY

Chronic pain (CP) is defined as sustained, recurring pain for at least 3 months (Narvaez Tamayo, et al., 2024) that is clinically associated with mood disorders such as depression and anxiety (Rayner, et al., 2016; Arango -Dávila & Rincón-Hoyos, 2018). However, there is little literature and research that explores the association between chronic pain and bipolar disorder (BD), characterized by periods of depression and mania/hypomania (Vieta et al., 2018). Objective: The objective of the present study consists of a narrative review of the prevalence of bipolarity of different chronic pain conditions in patients with bipolar disorder, as well as identifying variables associated with the level of functionality and intensity of pain. Methodology: A search will be carried out in scientific databases Pubmed, using the key

words: “chronic pain”, “bipolar disorder”; Narrative and systematic review articles from 2014 to 2024 and original articles from 2019 to 2024 will be included. Qualitative research is excluded. Results: In the screening stage, 23 articles were found; Based on filtering by exclusion criteria, 10 articles were included in the final sample. The prevalence of CP in people with possible BD is estimated at 23.7% (Stubbs et al., 2015).

Keywords

Chronic pain - Bipolar disorder - Comorbidity - Health Psychology

BIBLIOGRAFÍA

- Arango-Dávila, C. A., & Rincón-Hoyos, H. G. (2018). Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y dolor crónico: múltiples manifestaciones de un núcleo fisiopatológico y clínico común. *Revista colombiana de Psiquiatría*, 47(1), 46-55.
- Narvaez Tamayo, M. A., Aguayo, C., Atencio, E., Garcia, J. B., Cabrera, C., Castañeda, C., ... & Toro, M. (2024). Pain as a disease in the new International Classification of Diseases (ICD-11): Latin American expert consensus. *Pain Management*, 14(3), 139-151.
- Rayner, L., Hotopf, M., Petkova, H., Matcham, F., Simpson, A., & McCracken, L. M. (2016). Depression in patients with chronic pain attending a specialised pain treatment centre: prevalence and impact on health care costs. *Pain*, 157(7), 1472-1479.
- Rosales, M. G., & Goldfarb, M. R. (2019). Rumiación: ¿Factor mantenedor de la comorbilidad dolor crónico y depresión? Una revisión actualizada. In XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigadores de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Stubbs, B., Eggermont, L., Mitchell, A. J., De Hert, M., Correll, C. U., Soundy, A., ... & Vancampfort, D. (2015). The prevalence of pain in bipolar disorder: a systematic review and large-scale meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 131(2), 75-88.
- Vieta, E., Berk, M., Schulze, T. G., Carvalho, A. F., Suppes, T., Calabrese, J. R., ... & Grande, I. (2018). Bipolar disorders. *Nature reviews Disease primers*, 4(1), 1-16.