

XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2024.

Prevalencia de ideación suicida en personas con dolor crónico.

Gonzalez Suarez, Nicolás, Gonzalez, Selene Lilian, Mandaglio, Daniela Nerina, Diaz Acosta, Mariana Valentina y Rosales, Ma. Guadalupe.

Cita:

Gonzalez Suarez, Nicolás, Gonzalez, Selene Lilian, Mandaglio, Daniela Nerina, Diaz Acosta, Mariana Valentina y Rosales, Ma. Guadalupe (2024). *Prevalencia de ideación suicida en personas con dolor crónico. XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXI Jornadas de Investigación. XX Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VI Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VI Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-048/602>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/evo3/y1z>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

PREVALENCIA DE IDEACIÓN SUICIDA EN PERSONAS CON DOLOR CRÓNICO

Gonzalez Suarez, Nicolás; Gonzalez, Selene Lilian; Mandaglio, Daniela Nerina; Diaz Acosta, Mariana Valentina; Rosales, Ma. Guadalupe
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El dolor crónico (DC) es aquel que persiste por al menos 3 meses, y es predictor de distintos trastornos mentales y de incapacidad funcional (Narvaez Tamayo et al, 2024). El trastorno mental más frecuente en quienes padecen DC es la depresión mayor, que alcanza un 60% de prevalencia comórbida. Aun así, el nivel de gravedad de la depresión no siempre se reporta. La ideación suicida es uno de los criterios que determina la gravedad del cuadro. Se trata de los pensamientos sobre la posibilidad de terminar con la propia vida (ICD-11, 2020; OMS, 2018). Objetivo: El presente trabajo es una revisión literaria acerca de la prevalencia entre dolor crónico e ideación suicida. Metodología: La búsqueda de investigaciones se realizó en las principales bases de datos: PubMed, Researchgate y Scielo, entre otras. Se incluyeron revisiones sistemáticas y meta-análisis publicadas entre 2019 y 2023. Conclusión: Los pacientes con dolor crónico presentan hasta un 40% más de posibilidades de padecer de ideación suicida, en comparación a la población control, y se estima que 1 de cada 4 personas con dolor crónico, han tenido ideación suicida reciente (Constanza et al., 2021; Know et al., 2023).

Palabras clave

Dolor crónico - Ideación suicida - Prevalencia - Psicología de la Salud

ABSTRACT

PREVALENCE OF SUICIDAL IDEATION IN PEOPLE WITH CHRONIC PAIN

Chronic pain (CP) is pain persists for at least 3 months, and is a predictor of various mental disorders and functional disability (Narvaez Tamayo et al., 2024). The most common mental disorder in those suffering from CP is major depression, with a comorbid prevalence of up to 60%. However, the severity level of depression is not always reported. Suicidal ideation is one of the criteria that determine the severity of the condition. It involves thoughts about the possibility of ending one's own life and, in some cases, the formulation of a plan to do so (ICD-11, 2020; WHO, 2018). Objective: The present work is a literature review on the prevalence of chronic pain and suicidal ideation, while also identifying the mechanisms underlying the relationship between these variables. Methodology: The search for research was conducted in the principal databases: Pubmed, Research-

Gate, and Scielo, Systematic reviews and meta-analyses published between 2019 and 2023 were included, in adult population. Conclusions: Patients with chronic pain are up to 40% more likely to experience suicidal ideation compared to the control population, and it is estimated that 1 in 4 people with chronic pain have had recent suicidal ideation (Constanza et al., 2021; Know et al., 2023).

Keywords

Chronic pain - Suicidal ideation - Prevalence - Health Psychology

BIBLIOGRAFÍA

- Kwon, C.-Y., & Lee, B. (2023). Prevalence of suicidal behavior in patients with chronic pain: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1217299.
- Narvaez Tamayo, M. A., Aguayo, C., Atencio, E., Garcia, J. B., Cabrera, C., Castañeda, C., ... & Toro, M. (2024). Pain as a disease in the new International Classification of Diseases (ICD-11): Latin American expert consensus. *Pain Management, 14*(3), 139-151.
- Organización Mundial de la Salud. (2018). Clasificación internacional de enfermedades (11.ª ed.). Ginebra: OMS.
- Rosales, M. G. (2023). Rumiación y metacognición en sujetos con dolor crónico [Tesis doctoral]. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.